Reutter
Desde 1915

# APÓSITO HIDROGEL

Cuidado de heridas avanzadas




| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| **Nombre:** | Apósito hidrogel tubo 15 gramos x unidad. |
| **Marca:** | Cranberry. |
| **Material:** | Gel amorfo cuyo contenido básico es agua más polímeros humectantes y absorbentes que controlan el exceso de humedad. |
| **Color:** | Incoloro |
| **Tamaño:** | 15 gramos. |
| **Presentación:** | Venta x unidad. |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Función:** | El objetivo del hidrogel es causar un desbridamiento autolítico en el lecho de una herida, a través de la humedad efectiva y controlada del gel.<br>El desbridamiento autolítico es la remoción del tejido necrótico, esfacelado y/o de fibrina de una herida. Estos tejidos están muertos, ocupan espacio e impiden que el tejido sano de una herida pueda cicatrizar, por tanto, es fundamental eliminarlos para permitir que el tejido granulatorio (sano) cicatrice de una manera funcional y estética en el paciente. La herida al contacto con el gel activa una serie de acciones metabólicas que estimulan las enzimas propias de la herida, humectando y degradando los tejidos mencionados, los cuales se retiran a través del arrastre mecánico en una curación avanzada de heridas. | | |
| **Látex:** | No. | **Estéril:** | No, el hidrogel es un insumo limpio. |
| **Vigencia:** | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | |
| **Almacenamiento:** | Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C. | | |
| **Uso:** | El hidrogel se usa en quemaduras, úlceras por presión, úlceras diabéticas, úlceras venosas y en general en todas aquellas heridas que presenten tejido necrótico, esfacelo y/o fibrina. Para lograr un efecto eficiente requiere complementar su uso con apósitos de curación avanzada, dependiendo su elección de las características de la herida. | | |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El hidrogel se usa posterior a la limpieza de la herida.
- Se puede usar de manera repetida, en el paciente hasta producir desbridamiento químico de los tejidos no funcionales de una herida.
- Se aconseja evaluar la herida cada 24 horas para controlar acción del gel y cuidar los bordes sanos de la piel.
- En caso de pizacón, prurito o cualquier otra reacción adversa vinculada al gel, suspenda su uso y consulte a su médico.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| Código Interno | Color | Olor | Viscosidad |
|---|---|---|---|
| AAPHIDO1 | Incoloro | Inoloro | 50000-100000 PaS |

Cranberry®

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

contacto@reutter.cl
+56 2 2489 7000
Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl

Reutter
Desde 1915

# APÓSITO HIDROGEL

Cuidado de heridas avanzadas

## CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado libre de látex
- ISO 13485 : 2016.

## DESCRIPCIÓN GRÁFICA




** Limpie la herida antes de utilizarlo, en caso de alguna reacción adversa suspenda su uso y consulte a un médico.

Cranberry®

PROVEEDOR ChileCompra Express
Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

contacto@reutter.cl
+56 2 2489 7000
Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

www.reutter.cl